

itrazol®

Itraconazole

Καψάκια σκληρά, 100 mg/cap

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.1 Ονομασία: ITRAZOL.
- 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Itraconazole. Έκδοχα: Sacrose, Hypromellose, Sodium methylparaben E219, Sodium propylparaben E217, Sugar spheres, Hard gelatine capsule No 0 (white – blue).
- 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Καψάκια.
- 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg ιτρακοναζόλης.
- 1.5 Περιγραφή – Συσκευασία: Συσκευασίες με 4, 6, 15 και 28 καψάκια χρώματος μπλε και άσπρου, ΒΤ x 4 CAPS (BLISTER), ΒΤ x 6 CAPS (BLISTER), ΒΤ x 15 CAPS (BLISTER), ΒΤ x 28 CAPS (BLISTER). Είναι πιθανό να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες που περιγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών.
- 1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικό.
- 1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) Ltd.
- 1.8 Παρασκευαστής: NATCO PHARMA LIMITED (παραγωγή pellets), RAFARM A.E.B.E. (πλήρωση καψακίων).
- 1.9 Συσκευαστής: RAFARM A.E.B.E.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

- 2.1 Γενικές πληροφορίες: Η ιτρακοναζόλη είναι ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο ευρέως φάσματος και αντιμετωπίζει πολλά είδη μυκήτων του κόλπου, δέρματος, στόματος, ματιών, νυχιών ή εσωτερικών οργάνων.
- 2.2 Ενδείξεις: **Πυλακοολογικές ενδείξεις:** (α) οξεία αιδοιοκολική καντιντίαση, ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας (β) υποτροπιάζουσα αιδοιοκολική καντιντίαση, ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί με καλλιέργεια (συντά είναι μη λοιμώδους αιτιολογίας, αλλά αλλεργική ή εξ υπερευαίσθησίας).
Δερματολογικές / Οφθαλμολογικές ενδείξεις: Ως εναλλακτική θεραπεία στις δερματομυκητιάσεις που προκαλούνται από δερματόφυτα και ζυμομυκήτες, στην ποικιλόχρου πιτυρίδα και στην μυκητιασική κερατιτίδα. **Σημείωση:** Η συστηματική θεραπεία στις παραπάνω ενδείξεις προτιμάται όταν η λοίμωξη εκτείνεται σε μεγάλη περιοχή του δέρματος, αφορά στο τριχωτό της κεφαλής και νύχια ή αρθρώσεις με διαταραγμένους αμυντικούς μηχανισμούς, κακή ανταπόκριση της τοπικής θεραπείας και επιμονή της μυκητιασικής λοίμωξης παρά τη θεραπεία.
Ουρομυκητιάσεις που προκαλούνται από δερματόφυτα και ζυμομυκήτες (είδη *Trichophyton, candida* κλπ) που έχουν επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
Συστηματικές μυκητιάσεις: • Πνευμονική και εξωπνευμονική ασπεργίλλωση • Εναλλακτική θεραπεία στη συστηματική καντιντίαση • Εναλλακτική θεραπεία στις κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις (συμπεριλαμβανομένης της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας) • ανσοκατασταλμένους ασθενείς • Στοματοφαρυγγική καντιντίαση σε ασθενείς HIV θετικούς • Ενδημικές μυκητιάσεις: ιστοπλάσμωση, βλαστομύκωση, παρακοκκιδιομύκωση • Εξωδερματική σποροτρίχωση.
Σημείωση: Πριν από την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να ληφθούν καλλιέργειες και να γίνουν κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις (ώμας μικροσκοπήση, βιοψίες, ορολογικές εξετάσεις) ώστε να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί ο αιτιολογικός παράγοντας.
Προφυλακτικά: Για την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή προφύλαξη της ιστοπλάσμωσης σε ασθενείς με AIDS. Εναλλακτικά για την προφύλαξη της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε ασθενείς με AIDS.
- Εφιαρτίται η προσοχή στο γεγονός ότι η χρόνια χορήγηση αζολών, αν και σε μικρότερο βαθμό η ιτρακοναζόλη, αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης *C. krusei, Aspergillus, Mucorales, Fusarium, T. glabrata* που συχνά παρουσιάζουν φυσική ανοχή στις αζόλες.
- 2.3 **Αντενδείξεις:** Η ιτρακοναζόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: Σε κύηση ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού (βλ. και 2.6). Σε περίπτωση υπερευαίσθησίας στο φάρμακο ή στα έκδοκά του. Επίσης, μη χρησιμοποιείται τα παρακάτω όταν κάνετε θεραπεία με ιτρακοναζόλη: • Ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία, όπως τερφεναδίνη, αστεμιζόλη και μιλζολαστίνη • Σιζαπρίδη, ένα φάρμακο που χορηγείται για ορισμένα προβλήματα του πεπτικού • Ορισμένα φάρμακα που ελαττώνουν την χοληστερόλη όπως, σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη • Ορισμένα πρεσβιακά φάρμακα όπως τριαζολόλημ και από του στόματος χορηγούμενη μιδαζολόλημ • Πιμοζίδη, ένα φάρμακο για ψυχωσικές διαταραχές • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού όπως η κινιδίνη και δοφετιλίδη.
- 2.4 **Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση**
- 2.4.1 Πάντα να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για το αν λαμβάνετε και άλλα φάρμακα, γιατί λαμβάνοντας ορισμένα φάρμακα μαζί μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία σας. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ήπαρ. Η δόση του φαρμάκου μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Δείτε το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ενώ παίρνετε το φάρμακο αυτό: ανορεξία, ναυτία, εμετό, κόπωση, πόνο στην κοιλιά ή σκουροχρώμα ούρα. Αν χρειάζεται να παίρνετε συνεχώς το φάρμακο αυτό για περισσότερο από 1 μήνα, ο γιατρός σας ίσως σας ζητήσει να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος. Ο λόγος είναι να αποκλειστεί εγκαίρως το ενδεχόμενο ανωμάλιου στο ήπαρ που αποτελεί μία πολύ σπάνια περίπτωση. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν αντιμετωπίζετε καρδιακό πρόβλημα. Αν ο γιατρός σας αποφασίσει να σας χορηγήσει το φάρμακο αυτό, θα σας δώσει οδηγίες για τα συμπτώματα που πρέπει να παρακολουθείτε. Ενημερώστε ή δείτε αμέσως το γιατρό σας εάν παρουσιάσετε μείωση της αναπνοής, μη αναμενόμενη αύξηση βάρους, πρήξιμο των κάτω άκρων ή της κοιλιάς, ασυνήθιστη κόπωση ή ξαφνικά ξυπνήσει τα βράδια. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε καμία ανωμαλία στους νεφρούς. Η δόση του φαρμάκου μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως, αν έχετε μία ασυνήθιστη αίσθηση μυρμηγκιάσματος, μουδιασματος ή αδυναμίας στα χέρια ή στα πόδια, καθώς λαμβάνετε το φάρμακο. Αν στο παρελθόν είχατε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο αντιμυκητιασικό, συζητήστε με τον γιατρό σας.
- 2.4.2 **Κύηση:** Μην χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αν είστε έγκυος. Αν βρισκόσθε σε ηλικία που μπορείτε να μείνετε έγκυος και υπάρχει τέτοια πιθανότητα, πρέπει να λαμβάνετε επαρκή αντισυλληπτικά μέτρα ώστε να είστε βέβαιη ότι δεν θα μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε το φάρμακο. Επειδή το φάρμακο παραμένει στον οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από τη λήξη της θεραπείας, θα πρέπει να συνεχίσετε την χρήση αντισυλληπτικών μέτρων μέχρι την επόμενη περίοδο σας, απ' όπου η θεραπεία με το φάρμακο θα έχει τελειώσει. Η ιτρακοναζόλη μπορεί να χορηγηθεί σε εγκύους μόνο κατά την κρίση του γιατρού και μόνο σε περιπτώσεις συστηματικών μυκητιάσεων που απειλούν τη ζωή και ο' αυτές τις περιπτώσεις, μόνο όταν η δυνητική ωφέλεια υπερνασταθμίζει το δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο.
- 2.4.3 **Γαλουχία:** Δεν πρέπει να θηλάξετε όταν παίρνετε ιτρακοναζόλη. Μια πολύ μικρή ποσότητα του φαρμάκου μπορεί να εμφανιστεί στο γάλα σας.
- 2.4.4 **Παιδιά:** Το φάρμακο αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε παιδιά. Ο γιατρός σας μπορεί να το χορηγήσει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
- 2.4.5 **Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να οδηγήσετε ή να χειρισθείτε μηχανήματα, εκτός αν αισθάνεστε ζάλη.
- 2.4.6 **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:** Δεν υπάρχουν.
- 2.5 **Άλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:** Μην παραλείπετε να αναφέρετε στο γιατρό σας ή στο φαρμακοποιό σας τα φάρμακα που λαμβάνετε από τη στιγμή. Φάρμακα τα οποία δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με το φάρμακο (βλ. και 2.3.) είναι: • Ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία όπως, τερφεναδίνη, αστεμιζόλη και μιλζολαστίνη • Σιζαπρίδη, ένα φάρμακο που χορηγείται για ορισμένα προβλήματα του πεπτικού • Ορισμένα φάρμακα που ελαττώνουν τη χοληστερόλη όπως σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη • Ορισμένα πρεσβιακά φάρμακα όπως τριαζολόλημ και από του στόματος χορηγούμενη μιδαζολόλημ • Πιμοζίδη, ένα φάρμακο για ψυχωσικές διαταραχές • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού όπως η κινιδίνη και δοφετιλίδη. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να ελαττώνουν σε μεγάλο βαθμό την δράση της ιτρακοναζόλης. Αυτό αναφέρεται ειδικά σε ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας (για παράδειγμα, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη και φαινοβαρβιτάλη) και της ψυμιατώσεως (π.χ. ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη και ισονιαζίδη). Θα πρέπει έτσι, να ενημερώσετε πάντα τον γιατρό σας αν χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά τα προϊόντα ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Συνδυασμός με ορισμένα άλλα φάρμακα μπορεί να απαιτεί αλλαγή της δόσης είτε της ιτρακοναζόλης είτε των άλλων φαρμάκων. Παραδείγματα είναι: • Ορισμένα αντιβιοτικά όπως η κλαριθρομυκίνη και η ερυθρομυκίνη • Ορισμένα φάρμακα για τη ψυμιατώση και την επιληψία (ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, καρβαμαζεπίνη) • Ορισμένα φάρμακα που δρουν στην καρδιά και στα αγγεία (διγοξίνη) και ορισμένα που ονομάζονται αναστολείς διαύλων ασβεστίου, όπως διδρονιπρίδη, βεραπαμίνη) • Φάρμακα που καθυστερούν την πήξη του αίματος (αντιπηκτικά) • Αντιδιυφθικά από του στόματος • Μεθυλπρεδνιζολόνη, ένα φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και σε ενέσιμη μορφή, σε φλεγμονές • Κυκλοσπορίνη Α, τακρόλιμους και ραπαμυκίνη (επίσης γνωστή ως σιρόλιμους) που χρησιμοποιούνται συνήθως μετά από μεταμόσχευση οργάνων • Ορισμένοι αναστολείς της HIV πρωτεάσης,

όπως πιτοναβίρη, ινδιναβίρη, σακουιναβίρη • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου, όπως τα αλκαλοειδή της Vincs, μπουσουλφάνη, δοσαεταξέλ και τριμετρεζάτη • Ορισμένα αγγολυτικά ή ηπιωτικά όπως βουσιπρόνη, αλπραζολάμη και βρωπιζολάμη • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως αναισθητικά, όπως μιδαζολάμη ενδοφλέβια, αλφαινανύλη • Εμπαστίνη, ένα φάρμακο για την αλλεργία • Ρεμπεξεστίν ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη. Αν λαμβάνετε κάποιο από τα φάρμακα αυτά συζητήστε το με το γιατρό σας.

Η απορρόφηση της ιρακοναζόλης είναι ανεπαρκής όταν η γαστρική οξύτητα είναι μειωμένη. Σε ασθενείς που παράλληλα λαμβάνουν αντιόξινα (π.χ. υδροξείδιο του αργιλίου) αυτά θα πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον 2 ώρες μετά από τη λήψη της ιρακοναζόλης. Ασθενείς με αλκυρωδρία, ορισμένοι ασθενείς με AIDS ή ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της γαστρικής έκκρισης (π.χ. H2-ανταγωνιστές, αναστολείς της αντλίας πρωτονίων) θα πρέπει να λαμβάνουν την ιρακοναζόλη μαζί με ποτό που περιέχει ανθρακικό (τύπου Cola). Αν έχετε αμφιβολίες συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.

- 2.6 **Δοσολογία:** Τα καψάκια πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μετά από ένα πλήρες γεύμα, γιατί μόνο έτσι θα απορροφηθούν σωστά από τον οργανισμό σας. Τα καψάκια πρέπει να ληφθούν με λίγο νερό. Η δόση και η διάρκεια θεραπείας εξαρτάται από το είδος της μυκητίασης και το μέρος του σώματος που προσβλήθηκε. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει λεπτομερώς για το τι πρέπει να κάνετε. Η παρακάτω δοσολογία είναι αυτή που χρησιμοποιείται πιο συχνά:

Είδος Μυκητίασης	Καψάκια ανά ημέρα	Διάρκεια Θεραπείας
Αιδοιοκοληκική καντιντίαση οξεία ή υποτροπιάζουσα	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα ή 2 καψάκια, 1 φορά την ημέρα	1 ημέρα 3 ημέρες
Ποικιλόχρους πιτυρίαση	2 καψάκια, 1 φορά την ημέρα	7 ημέρες
Δερματοφυτίες	2 καψάκια, 1 φορά την ημέρα ή 1 καψάκιο, 1 φορά την ημέρα	7 ημέρες 2 εβδομάδες
Δερματοφυτίες/Περιοχές με υπερκεράτωση (πέλματα, παλάμες)	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα ή 1 καψάκιο, 1 φορά την ημέρα	7 ημέρες 1 μήνας
Καντιντίαση στοματοφαρυγγικής κοιλότητας σε ασθενείς HIV (+)	1 καψάκιο, 1 φορά την ημέρα	2 εβδομάδες
Μυκητιασική κερατίτις	2 καψάκια, 1 φορά την ημέρα	3 εβδομάδες

Συστηματικές μυκητίσεις

- Ασπεργίλλωση
- Καντιντίαση
- Μη-μυηγιτιδική κρυπτοκόκκωση
- Κρυπτοκοκκική μυηγιτιδα
- Ιστοπλάσωση
- Σποροτρίχωση
- Παρακοκκιδιομύκωση
- Χρωμομύκωση
- Βλαστομύκωση

Καθορίζονται μεγαλύτερες δόσεις

Καθορίζεται χρονικό διάστημα

Ουνοχυμικήσεις: η δόση και η διάρκεια θεραπείας εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ασθενούς και ο γιατρός θα καθορίσει αν θα σας συστήσει συνεχής ή κυκλική θεραπεία.

Είδος Μυκητίασης	Καψάκια ανά ημέρα	Διάρκεια Θεραπείας
Συνεχής θεραπεία νυκτιών	2 καψάκια, 1 φορά την ημέρα	3 ημέρες
Κυκλική θεραπεία νυκτιών	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	1 εβδομάδα ανά μήνα για 3 ημέρες (χέρια) και 3-4 μήνες (πόδια)

Αναλυτικά: Μετά από το τέλος της εβδομάδας, σταματάτε να λαμβάνετε το φάρμακο για 3 εβδομάδες. Μετά ο κύκλος επαναλαμβάνεται, 2 φορές ακόμη για τις μυκητίσεις των νυκτιών του χεριού και 2-3 φορές ακόμη για τις μυκητίσεις των νυκτιών του ποδιού (με ή χωρίς παράλληλη μυκητίση των νυκτιών του χεριού), (βλ. τους παραπάνω πίνακες)

Εβδομάδα	1η	2η - 3η - 4η	5η	6η - 7η - 8η	9η	10η-11η-12η
Νύκτια χεριών μόνο	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Δεν λαμβάνετε Ιρακοναζόλη	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Δεν λαμβάνετε Ιρακοναζόλη	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Λήξη Θεραπείας

Εβδομάδα	1η	2η - 3η - 4η	5η	6η - 7η - 8η	9η	10η - 11η - 12η	14η-15η-16η
Νύκτια ποδιών (με ή χωρίς παράλληλη μυκητίση των νυκτιών του χεριού)	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Δεν λαμβάνετε Ιρακοναζόλη	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Δεν λαμβάνετε Ιρακοναζόλη	2 καψάκια, 2 φορές την ημέρα	Δεν λαμβάνετε Ιρακοναζόλη	Λήξη Θεραπείας

- 2.7 **Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:** Αν πήρατε μεγάλη ποσότητα ιρακοναζόλης, θα πρέπει να συμβουλευθείτε αμέσως τον γιατρό σας, ο οποίος και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777.

Πληροφορίες για τον ιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας: Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας, θα πρέπει να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα. Σε διάστημα μιας ώρας από τη λήψη, μπορεί να διενεργηθεί πλύση στομάχου. Αν κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας. Η ιρακοναζόλη δεν απομακρύνεται με αιμοδιάλυση. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

- 2.8 **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα: δυσπεψία, ναυτία, πόνος στην κοιλιά και δυσκοιλιότητα. Ακόμη μπορεί να παρουσιασθεί πονοκέφαλος, αναστρέψιμες αυξήσεις στα ηπατικά ένζυμα, διαταραχές της περιόδου ή ζάλη. Η υπερευαισθησία στην ιρακοναζόλη είναι σπάνια. Μπορεί να την αναγνωρίσετε, για παράδειγμα, από δερματικό εξάνθημα, φαγούρα, αργή αναπνοή ή και ιδρώτα στο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε ιρακοναζόλη και να δείτε τον γιατρό σας. Πολύ σπάνια, μπορεί να εμφανισθεί μια αίσθηση μούδιασματος στα χείλη ή μια σοβαρή διαταραχή στο δέρμα. Αν αυτό παρουσιασθεί, σταματήστε τη λήψη ιρακοναζόλης και επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Ενημερώστε ή δείτε αμέσως το γιατρό σας εάν παρουσιάσετε μείωση της αναπνοής, μη αναμενόμενη αύξηση βάρους, πρήξιμο των κάτω άκρων ή της κοιλιάς, συνθησιώδη κόπωση ή ξαφνικά έντονα ή βράδια. Ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης μπορεί να παρουσιαστούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα, τα οποία όμως είναι σπάνια: μυϊκή αδυναμία, ίκτερος, σκουρόχρωμα ούρα και ωχρά κόπρανα, συσσώρευση υγρών του σώματος, τριχόπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διακόψτε το φάρμακο και δείτε το γιατρό σας αμέσως. Να μην παραλείπετε να αναφέρετε κάθε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια στο γιατρό σας ή στον φαρμακοποιό σας.

- 2.9 **Ημερομηνία λήξης προϊόντος:** Αναγράφεται στην εξωτερική και στην εσωτερική συσκευασία. Αν αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, να μην χρησιμοποιείτε το φάρμακο.

2.10 **Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 15-30°C (θερμοκρασία δωματίου).

2.11 **Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φυλλαδίου:** 02/2007

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποιο άλλον πάθηση, χωρίς προηγούμενες να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτηματικό γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατρέπεται το φάρμακο σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζεστή και η υγρασία μπορούν να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.



Verisfield (UK) Ltd, 41 Chalton str., NW 1 1JD, London UK.

Υποκατάστημα Ελλάδος: Βύρωνος 8, 152 31 Χαλάνδρι Τ 210 7475 196 | F 210 7475 197 | E info@verisfield.gr | www.verisfield.gr