

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 - 1.1 Εμπορική ονομασία: ITRAZOL®.
 - 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Ιτρακοναζόλη. Έκδοχα: Sorbitol 70% (non-crystallizing solution), Sodium saccharin dihydrate, Propylene glycol, Hydroxypropyl- β -cyclodextrin, Hydrochloric acid (concentrated), Sodium hydroxide, Cherry flavour, Caramel flavour, Water purified.
 - 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Πόσιμο διάλυμα.
 - 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Το πόσιμο διάλυμα Itrazol περιέχει 10mg ιτρακοναζόλης ανά ml διαλύματος.
 - 1.5 Περιγραφή- Συσκευασία: Φιάλη 150ml από γυαλί amber, με βιδωτό πλαστικό πώμα & δοσομετρική μεζούρα.
 - 1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικό για συστηματική χρήση.
 - 1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) Ltd.
 - 1.8 Παρασκευαστής: RAFARM ΑΕΒΕ.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
 - 2.1 Γενικές πληροφορίες: Το πόσιμο διάλυμα Itrazol είναι φάρμακο για τη θεραπεία λοιμώξεων από μύκητες.
 - 2.2 Ενδείξεις: Το πόσιμο διάλυμα Itrazol ενδείκνυται: (α) Για τη θεραπεία της στοματικής και/ή οισοφαγικής καντινιάσης σε ασθενείς με HIV(+) ή άλλους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (β) Ως προφύλαξη των εν τω βάθει μυκητιασικών λοιμώξεων οι οποίες αναμένεται να είναι ευαίσθητες στην ιτρακοναζόλη, όταν η καθιερωμένη θεραπεία θεωρείται ακατάλληλη, σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή σε αυτούς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και οι οποίοι αναμένεται να είναι ουδετεροpenικοί (δλκ. < 500 κύτταρα / μl). Επί του παρόντος υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας στην πρόληψη της ασηπεργίλλωσης.
 - 2.3 Αντενδείξεις: Το πόσιμο διάλυμα Itrazol δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: (α) Σε κύηση ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού (β) Σε περίπτωση αυνεκυσθησίας στο φάρμακο ή στα έκδοχά του.
Επίσης μη χρησιμοποιείτε τα παρακάτω όταν κάνετε θεραπεία με Itrazol:
 - Ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία όπως τερφεναδίνη, αστεμιζόλη και μιζολαστίνη
 - Σιζαπριδίνη, φάρμακο που χορηγείται για ορισμένα προβλήματα του πεπτικού
 - Ορισμένα φάρμακα που ελαττώνουν την χοληστερόλη όπως, σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη
 - Ορισμένα πρεμιστικά φάρμακα όπως τριαζολόλη και από του στόματος χορηγούμενη μεδαζολόλη
 - Πιμοζιδίνη, φάρμακο για ψυχωσικές διαταραχές
 - Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού όπως η κινιδίνη και η δοφετιλιδίνη.
 - 2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
 - 2.4.1 Γενικά: Πάντα να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για το αν λαμβάνετε και άλλα φάρμακα γιατί λαμβάνοντας ορισμένα φάρμακα μαζί μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία σας. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ήπαρ. Η δόση του πόσιμου διαλύματος μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Σε ασθενείς με αυξημένες τιμές ηπατικών ενζύμων ή με ενεργό ηπατικό νόσημα ή που έχουν στο αναμνηστικό τους ιατρικό ιστορικό από άλλα φάρμακα, η θεραπεία με το φάρμακο δε θα πρέπει να χορηγείται, εκτός αν η αναμενόμενη ωφέλεια υπεραντασθαμίζει τον κίνδυνο της ηπατικής βλάβης. Δείτε το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ενώ παίρνετε το φάρμακο αυτό: ανορεξία, ναυτία, εμετό, κόπωση, πόνο στην κοιλιά ή σκουροχρώμα ούρα. Αν χρειάζεται να παίρνετε συνεχώς πόσιμο διάλυμα Itrazol για περισσότερο από 1 μήνα, ο γιατρός σας ίσως σας ζητήσει να κάνετε τακτικά εξετάσεις αίματος. Ο λόγος είναι να αποκλειστεί εγκαίρως το ενδεχόμενο ανωμαλίας από το ήπαρ που αποτελεί μια πολύ σπάνια περίπτωση. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν αντιμετωπίζετε καρδιακό πρόβλημα. Αν ο γιατρός σας αποφασίσει να σας χορηγήσει το φάρμακο αυτό, θα σας δώσει οδηγίες για τα συμπτώματα που πρέπει να παρακολουθείτε. Ενημερώστε ή δείτε αμέσως το γιατρό σας εάν παρουσιάσετε μείωση της αναπνοής, μη αναμενόμενη αύξηση βάρους, πρήξιμο των κάτω άκρων ή της κοιλιάς, ασυνήθιστη κόπωση ή εάν ξαφνικά ξυπνάτε τα βράδια. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε καμιά ανωμαλία στους νεφρούς. Η δόση του πόσιμου διαλύματος Itrazol μπορεί να χρειασθεί προσαρμογή. Πρέπει επίσης να ενημερώσετε τον γιατρό σας αμέσως, αν έχετε μια ασυνήθιστη αίσθηση μυρμηγκίσματος, μουδιασματος ή αδυναμίας στα χέρια ή στα πόδια, καθώς λαμβάνετε το πόσιμο διάλυμα. Αν στο παρελθόν είχατε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε κάποιο άλλο αντιμυκητιασικό, συζητήστε το με τον γιατρό σας.
 - 2.4.2 Ηλικιωμένοι: Το πόσιμο διάλυμα Itrazol δεν πρέπει να γίνεται σε ηλικιωμένους, όμως ο γιατρός σας μπορεί να το χορηγήσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν τα προσδοκώμενα οφέλη υπερβαίνουν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
 - 2.4.3 Κύηση: Μην χρησιμοποιείτε πόσιμο διάλυμα Itrazol αν είστε έγκυος. Αν βρισκόσαστε σε ηλικία που μπορείτε να μείνετε έγκυος και υπάρχει τέτοια πιθανότητα, πρέπει να λαμβάνετε επαρκή αντισυλληπτικά μέτρα ώστε να είστε βέβαιη ότι δεν θα μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε το φάρμακο. Επειδή το πόσιμο διάλυμα Itrazol παραμένει στον οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από την λήξη της θεραπείας, θα πρέπει να συνεχίσετε τη χρήση αντισυλληπτικών μέτρων μέχρι την επόμενη περίοδο σας, αφού η θεραπεία με πόσιμο διάλυμα Itrazol θα έχει τελειώσει.
 - 2.4.4 Γαλουκία: Δεν πρέπει να θηλάζετε όταν παίρνετε πόσιμο διάλυμα Itrazol. Μια πολύ μικρή ποσότητα του φαρμάκου μπορεί να εμφανισθεί στο γάλα σας.
 - 2.4.5 Παιδιά: Επειδή τα κλινικά στοιχεία όσον αφορά στη χρήση του πόσιμου διαλύματος Itrazol σε παιδιατρικούς ασθενείς είναι περιορισμένα, δεν συιστάται η χρήση του πόσιμου διαλύματος Itrazol στα παιδιά.
 - 2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχει πρόβλημα να το οδηγήσετε ή να χειρισθείτε μηχανήματα, εκτός αν αισθάνεστε ζάλη.
 - 2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Βλέπε § 2.3.
 - 2.5 Άλλες επιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Μην παραλείπετε να αναφέρετε στο γιατρό σας τα φάρμακα που λαμβάνετε αυτά την στιγμή. Φάρμακα τα οποία δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με πόσιμο διάλυμα Itrazol (βλέπε και § 2.3.) είναι: • Ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία όπως, τερφεναδίνη, αστεμιζόλη και μιζολαστίνη • Σιζαπριδίνη, ένα φάρμακο που χορηγείται για ορισμένα προβλήματα του πεπτικού. • Ορισμένα φάρμακα που ελαττώνουν τη χοληστερόλη όπως, σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη. • Ορισμένα πρεμιστικά φάρμακα όπως, τριαζολόλη και από του στόματος χορηγούμενη μεδαζολόλη. • Πιμοζιδίνη, ένα φάρμακο για ψυχωσικές διαταραχές. • Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού όπως η κινιδίνη και η δοφετιλιδίνη. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να ελαττώσουν σε μεγάλο βαθμό τη δράση της ιτρακοναζόλης. Αυτό αναφέρεται ειδικά σε ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας (για παράδειγμα καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη και φαινοβαρβιτάλη) και της φυματίωσης (π.χ. ριφαμπικίνη, ριφαμυτινίνη και ισονιαζίδη). Θα πρέπει έτσι, να ενημερώνετε πάντα το γιατρό αν χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά τα προϊόντα ώστε να ληφθούν υπόψη τα κατάλληλα μέτρα.

Συνδυασμός με ορισμένα άλλα φάρμακα μπορεί να απαιτεί αλλαγή τις δόσεις είτε του Itrazol είτε των άλλων φαρμάκων. Παραδείγματα είναι:

- Ορισμένα αντιβιοτικά όπως η κλαριθρομυκίνη και η ερυθρομυκίνη.
- Ορισμένα φάρμακα για τη ψυχιατρική και την επιληψία (ριβαρπακίνη, ισονιαζιδό, καρβαμαζεπίνη).
- Ορισμένα φάρμακα που δρουν στην καρδιά και στα αγγεία (διγοξίνη) και ορισμένα που ονομάζονται αναστολείς διαύλων ασβεστίου, όπως αυτές τις ομάδες των διυδροπυριδινίων και βεραπαμίλη.
- Φάρμακα που καθυστερούν την πήξη του αίματος.
- Αντιβιοτικά από το στόματος.
- Μεθυλφουροζιλόνη, ένα φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και σε ενήλικη μορφή, σε φλεγμονές.
- Κυκλοσπορίνη Α, τακρόλιμους και παναμυκίνη (έπισης γνωστή ως σιρόλιμους) που χρησιμοποιούνται συνήθως μετά από μεταμόσχευση οργάνων
- Ορισμένου αναστολείς της HIV πρωτεάσης, όπως ριτοναβίρη, ινδιναβίρη, σακουϊναβίρη.
- Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου, όπως τα αλκαλοειδή της Vinca, Βουσουλαφάνη, δοσεταξέλη και τριμετεξέλη.
- Ορισμένα εγκεφαλοχημικά ή ψυχοτικά όπως θοπασιρόλη, αλπραζολάμη, βρωπιζολάμη.
- Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως αναισθητικά, όπως μιδαζολάμη ενδοφλέβια, αλφαιντανύλη.
- Εμψαστίνη, ένα φάρμακο για την αλλεργία.
- Ρεμπεξετίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη.

Αν λαμβάνετε κάποιο από τα φάρμακα αυτά συζητήστε το με το γιατρό σας.

Η απορρόφηση της ιπρακοναζόλης είναι ανεπαρκής όταν η γαστρική οξύτητα είναι μειωμένη. Σε ασθενείς που παράλληλα λαμβάνουν αντιόξινα (π.χ. υπεροξείδιο του αργιλίου) αυτά θα πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον 2 ώρες μετά από τη λήψη του Itrazol. Ασθενείς με αλκορμία, ορισμένοι ασθενείς με AIDS ή ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της γαστρικής έκκρισης (π.χ. Η2-ανταγωνιστές, αναστολείς της αντλίας πρωτονίων) θα πρέπει να λαμβάνουν το Itrazol μαζί με ποτό που περιέχει ανθρακικό (τύπου cola).

Αν έχετε αμφιβολίες συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακείο.

- 2.6 **Δοσολογία:** Για καλύτερη απορρόφηση, το πόσιμο διάλυμα Itrazol πρέπει να λαμβάνεται χωρίς τροφή (οι ασθενείς πρέπει να μην λαμβάνουν τροφή για τουλάχιστον μία ώρα μετά τη λήψη). Για τη θεραπεία της στοματικής και/ή οισοφαγικής καντιντίασης, το πόσιμο διάλυμα θα πρέπει να ανακινείται σε όλη τη στοματική κοιλότητα (περίπου 20 δευτερόλεπτα) πριν την κατάποση. Δεν πρέπει να ξεπλύνετε το στόμα μετά την κατάποση (οι ασθενείς πρέπει να μην λαμβάνουν τροφή για τουλάχιστον μία ώρα μετά τη λήψη).

Θεραπεία της στοματικής και/ή οισοφαγικής καντιντίασης: 200mg (2 δοσομετρικές μεζούρες) την ημέρα σε δύο λήψεις ή εναλλακτικά σε μία λήψη, για 1 εβδομάδα. Αν δεν σημειωθεί αποτέλεσμα μετά 1 εβδομάδα, η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 1 εβδομάδα επιπλέον.

Θεραπεία στοματικής και/ή οισοφαγικής καντιντίασης ανθεκτικής στη φλουκοναζόλη: 100mg ως 200mg (1-2 δοσομετρικές μεζούρες) 2 φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες. Αν δεν σημειωθεί αποτέλεσμα μέσα σε 2 εβδομάδες, η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 2 εβδομάδες επιπλέον. Αν δεν υπάρχουν σημεία βελτίωσης, η ημερήσια δόση των 400mg δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 14 ημέρες.

Προφύλαξη από μυκητιασικές λοιμώξεις: 5mg/Kg την ημέρα χορηγούμενα σε δύο λήψεις. Στις κλινικές μελέτες, η θεραπεία προφύλαξης ξεκινούσε αμέσως πριν την κυτταροστατική θεραπεία και γενικά μία εβδομάδα πριν την χειρουργική μεταμόσχευσης. Η θεραπεία συνεχιζόταν μέχρι την ανάκαμψη των ουδετερόφιλων (δnl. > 1000 κύτταρα/μl). Από κλινικές μελέτες σε ουδετεροπενικούς ασθενείς οι φαρμακοκινητικές παράμετροι δείχνουν αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των στόμων. Η παρακολούθηση των επιπέδων στο αίμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα παρουσία γαστρεντερικής βλάβης, διάρροιας και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λήψης Itrazol πόσιμο διάλυμα.

Παιδιατρική χρήση: Βλέπε παράγραφο 2.4.5. **Προφύλαξη από μυκητιασικές λοιμώξεις:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αποτελεσματικότητας σε ουδετεροπενικά παιδιά. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία ως προς την ασφάλεια της δόσης των 5mg/Kg την ημέρα χορηγούμενα σε δύο λήψεις. Η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών όπως διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετος, πυρετός, εξάνθημα και βλεννογονιτίδα ήταν μεγαλύτερη από ότι στους ενήλικες.

- 2.7 **Υπερδοσολογία – Αντιμετώπιση:** Αν πάρετε υπερβολική ποσότητα πόσιμου διαλύματος Itrazol, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως το γιατρό σας. Εκείνος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. **Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:** 210 7793777.

Πληροφορίες για τον γιατρό σε περίπτωση υπερδοσολογίας: Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας συνιστάται υποστηρικτικά μέτρα. Μπορεί να γίνει πλύση στομάχου μέσα σε 1 ώρα από τη λήψη. Ενεργός άνθρακας μπορεί να χορηγηθεί αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η ιπρακοναζόλη δεν απομακρύνεται με αιμοδιύλιση. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

- 2.8 **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Μπορεί να εμφανισθούν τα ακόλουθα συμπτώματα: Ναυτία, έμετος, πόνος στην κοιλιά και διάρροια. Μπορεί ακόμη να εμφανισθούν κεφαλαλγία και ζάλη, αύξηση πτυακίων ενζύμων, αλλεργικές αντιδράσεις. Η υπερευαισθησία στο πόσιμο διάλυμα Itrazol είναι σπάνια. Θα τιν αναγνωρίζεται π.χ. από εξάνθημα του δέρματος, φαγοίρα, μείωση του ρυθμού της αναπνοής και/ή πρήξιμο στο πρόσωπο. Αν συμβούν αυτά διακόψτε το πόσιμο διάλυμα Itrazol και δείτε αμέσως το γιατρό σας. Πολύ σπάνια, μπορεί να εμφανισθεί μια σίσηση μυκητιασικών στα άκρα. Αν αυτό συμβεί σταματήστε τη λήψη του πόσιμου διαλύματος Itrazol και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης μπορεί να παρασταστούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα, τα οποία όμως είναι σπάνια: μυϊκή αδυναμία, ίκτερος, ακουρόχρωμα άκρα και ωχρά κόπρανα ή συσσώρευση υγρών του σώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διακόψτε το πόσιμο διάλυμα Itrazol και δείτε το γιατρό σας αμέσως. Προφύλαξη σε ουδετεροπενικούς ασθενείς: στις κλινικές μελέτες η διάρροια ήταν η πιο συχνά ανεπιθύμητη ενέργεια. Αυτή η διαταραχή του γαστρεντερικού συστήματος μπορεί αν επηρεάσει την απορρόφηση και μπορεί να τροποποιηθεί η μικροβιολογική κλωρίδα ενόσωντας τον αποικισμό των μυκήτων. Πρέπει να εξετάζεται η διακοπή του πόσιμου διαλύματος Itrazol σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην διατάξετε να αναφέρτε κάθε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια στο γιατρό ή στο φαρμακείο σας.

- 2.9 **Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:** Αναγράφεται στην συσκευασία. Αν η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- 2.10 **Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος:** Το πόσιμο διάλυμα Itrazol διατηρείται σε θερμοκρασία $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Μετά την αποσφράγιση, το διάλυμα διατηρείται για 30 ημέρες σε θερμοκρασία $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

- 2.11 **Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου:** 02/2007.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

• Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγούμενα να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.

- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακείο σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακείο σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατρέψτε το φάρμακο σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ** Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Verisfield®

Verisfield (UK) Ltd, 41 Chalton str., NW1 1JD, London UK. Υποκατάστημα Ελλάδος: Βύρωνος 8, 152 31 Χαλάνδρι
T 210 7475196 | F 210 7475197 | E info@verisfield.gr | www.verisfield.gr